

高雄市立民生醫院藥劑科用藥指導單 ①

英文品名：Warfarin (Mafarin®) 5 mg 中文品名：脈化寧錠

作用：是一種口服抗凝血劑，可以防止血栓形成。

用藥方式：請遵照醫師指示服藥，通常每天一次，同一時間服用。

用藥注意事項：

1. 用藥期間遵照醫師指示定期監測 PT (凝血酵素原時間)。
2. 服藥前先告知醫師是否對本藥、阿斯匹靈、tartrazine(黃色色素)過敏。
3. 服藥前先告知醫師你過去之病史，尤其是出血問題(潰瘍、經血量多)、糖尿病、肝腎疾病、高血壓、癲、關節炎、甲狀腺機能異常及最近是否有開刀等。
4. 請讓你的醫師或牙醫師知道你正在服用 Warfarin。
5. 應避免從事易引起創傷之活動。
6. 請小心刷牙，儘量使用軟毛牙刷。
7. 勿自行更換不同廠牌之 Warfarin。
8. 勿自行任意停藥或自行服用其他藥物(尤其是 aspirin、vit K、vit E)。
9. 孕婦、計畫懷孕或授乳婦女請在開始服藥前先告知醫師。
10. 避免飲酒，飲食習慣及運動量盡量固定，不要突然增減攝取含多量 vit K 食物(如：動物肝臟、綠色蔬菜、菠菜、芥藍菜、花椰菜、綠茶)之食用量，因這些食物會減低 Warfarin 之藥效。

此藥品可能引起副作用

出現不尋常出血症狀，如：流鼻血、咳血、突然瘀傷、疲倦、糞便顏色變深變黑、尿液成紅色或暗褐色、刷牙時有血絲或不曾發生過的頭痛、腹瀉和背痛時，則須立即就醫。