

高雄市立民生醫院藥劑科肺結核用藥指導單⑥

| 英文品名 | 中文品名 |
|---|----------|
| Ethambutol(Epbutol [®]) 400 mg | 易復癆錠 |
| Isoniazid(INAH)(Inavita [®]) 100 mg | 愛娜癆錠 |
| Pyrazinamide(Mide [®]) 500 mg | 邁得 |
| Rifampicin(Rifampicin [®] ; Rifampin [®]) 300 mg ; 450 mg | 立汎；利肺寧膠囊 |
| Rifampicin 120 mg & Isoniazid 80 mg & Pyrazinamide 250 mg (Rifater [®]) | 衛肺特糖衣錠 |

作用：

1. 抗結核菌，通常需數種併用，以免結核菌產生抗藥性。由於這類藥品對於休止期狀態之結核菌無效，所以須長期給藥，療程由六個月至二年不等。
2. Rifampicin 亦可用於治療奈瑟氏腦膜炎球菌。

用藥方式：

- 1.請遵照醫師指示服用，通常一天一次。
- 2.立汎(Rifampicin[®])、利肺寧(Rifampin[®])和衛肺特糖衣錠(Rifater)應空腹服用；
另易復癆錠和邁得(Mide[®])可空腹服用，但若發生反胃時可與食物並用，以減輕症狀。

用藥注意事項

* 共同注意事項

1. 服用抗結核病藥需定期監測肝功能，服用 Isoniazid、Rifater 及 Eambutol 病人，亦定期追蹤視力。
2. 不可因症狀改善而擅自停藥，以免感染復發。
3. 若有以下情形，請在服藥前告知醫師：
懷孕、曾發生藥物過敏、正服用其他藥物、你的病史，如肝、腎疾病、糖尿病或酒精中毒。
4. 請務必按時複診及作相關檢查，以評估對藥物之反應。
5. 避免飲酒。

| 藥品名 | 個別注意事項 |
|--------------------------------------|--|
| 易復癆錠(Eambutol®) | 1. 每隔三至六個月需作眼睛檢查。 2. 服用本藥 2 小時內，不可服用含鋁之制酸劑。 3. 本藥可能引起視覺模糊，則避免從事危險工作。 |
| 愛娜癆錠(Inavita®) | 若同時在服用胃乳，請先服愛娜癆錠(Inavita®)，隔一小時再服用胃乳。 |
| 邁得 Pyrazinamide(Mide®) | 服用本藥可能會影響尿液檢測。 |
| 立汎、利肺寧膠囊 (Rifampicin®; Rifampin®) | 1. 遵醫囑按時服藥，因不規則服藥易引起血液及肝臟問題。 2. 服用本藥有人會昏昏欲睡，則儘量避免從事危險工作。 3. 本藥會影響口服避孕藥之作用，則服本藥前先與醫師討論。 |

此藥品可能引起副作用

| 藥品名 | 副作用 |
|--------------------------------------|---|
| 易復癆錠(Eambutol®) | 視覺變化（如模糊不清）、發疹發癢、關節痛、胃腸不適、呼吸困難、蕁麻疹，臉、喉嚨腫脹。 |
| 愛娜癆錠(Inavita®) | 皮膚發疹、疲勞、噁心嘔吐、皮膚眼睛發黃、尿液顏色變深、胃腸不適、視覺問題、手腳刺痛、緊繃感。 |
| 邁得 Pyrazinamide(Mide®) | 發燒、異常倦怠、食慾減退、關節痛或腫脹、皮膚發疹或發癢、皮膚眼睛發黃。 |
| 立汎、利肺寧膠囊 (Rifampicin®; Rifampin®) | 1. 蕁麻疹、皮膚或嘴巴腫痛潰爛、發燒、黃疸(皮膚眼睛發黃)、胃腸不適、心口灼熱、類流行性感感冒症狀。 2. 若尿液、糞便、唾液等體液呈現橙紅色，為正常現象，不必擔心。 |