

認識麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗

麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗是利用組織培養製造的活性減毒疫苗，對這三種疾病的預防效果可達 95% 以上，幼兒在出生滿十五個月時接種效果最好。

◎接種後可能的反應有下列幾項：

1. 接種部位反應很少。
2. 與麻疹疫苗一樣，在接種後第 5~12 天，偶有疹子、咳嗽、鼻炎或發燒等症狀。
3. 與德國麻疹疫苗一樣，偶有發燒、暫時性關節痛。
4. 腮腺炎疫苗曾有引起輕微中樞神經反應之病例報告，但機率極小。
5. 接種後，請多喝開水，如有特殊反應時，請至醫院診治處理。

◎注意事項及禁忌：

1. 注射後部位勿揉，只要輕壓即可。
2. 接種三個月內應避免懷孕。
3. 如曾注射過免疫球蛋白、血漿或輸血，則要等三個月後才能接種，以免失效。
4. 免疫不全者包括使用腎上腺皮質素或抗癌藥物者、孕婦等等，最好不要接受疫苗的接種，比較安全。

諮詢電話：07-7511131 分機 2246

民生醫院全體醫護人員 祝您早日康復