

高雄市立民生醫院藥劑科用藥指導單②

英文品名：Digoxin (Lanoxin®) 0.25 mg 中文品名：隆我心錠

作用：Digoxin 是一種強心劑，主要作用為增加心肌收縮力，治療心臟衰竭及心房顫動等心律不整症狀。

用藥方式：請依照醫師指示使用，不可任意突然停藥或增減劑量，每日於固定時間服用。

用藥注意事項：

1. 若同時正服用其他藥物（包括成藥、制酸劑、胃藥、抗生素、利尿劑、甲狀腺藥及中草藥），請告知醫師說明你正在服用 Digoxin，以避免 Digoxin 的作用受到影響。
2. 因 Digoxin 大部分在腎臟排泄，所以腎功能不全病人，請主動告知醫師你的腎功能狀況。
3. 服用 Digoxin 期間，需定期監測心功能、電解質（尤其是鉀離子）及腎功能。
4. 請勿任意更換或使用不同廠牌之 Digoxin。
5. 勿將 Digoxin 從原來容器轉移到其他容器。
6. Digoxin 可能讓你昏昏欲睡，盡量避免從事容易引起傷害的危險性活動，如：開車、操作機械。
7. 服藥期間建議低鈉低鹽、高鉀飲食，如：柳丁或果汁。

此藥品可能引起副作用

1. 心跳不規則、呼吸困難。
2. 噁心、嘔吐、厭食、食慾不佳。
3. 皮膚發疹、癢。
4. 視力模糊、視覺物體周圍有黃綠色色圈。
5. 疲倦、意識不清、四肢無力或刺痛感。